

Schéma de traitement de la candidose orale

FACTEURS DE RISQUE DE LA CANDIDOSE ORALE

Facteurs de risque locaux

- Appareils dentaires
- Corticostéroïdes topiques (p. ex. en inhalateur)
- Tabagisme
- Mauvaise hygiène buccale
- Hyposialie

Facteurs de risque généraux

- VIH
- Chimiothérapie
- Antibiotiques
- Bas âge et âge avancé
- Affections endocriniennes (mauvaise régulation de la glycémie)
- Carences nutritionnelles
- Régime riche en glucides

AGENT RECOMMANDÉ*

POSOLOGIE

PRIX DE GROS DU MÉDICAMENT

pour 1 SEMAINE**

(honoraires professionnels et marge bénéficiaire non compris)

COMMENTAIRES CLINIQUES

**Nystatine
(voie orale)**

**500 000 unités (5 mL) à faire
tourbillonner dans la bouche
avant d'avaler, 4 fois par jour,
pendant 7 à 14 jours**

<\$25

Durée en fonction de la réponse

Remarque d'ordre clinique : Toujours répéter au patient de **FAIRE TOURBILLONNER** la solution orale dans la bouche avant de **L'AVALER**

**Fluconazole
(voie orale)**

**200 mg par voie orale le jour 1,
puis 100 mg par voie orale 1 fois
par jour pendant 7 à 14 jours**

**Comprimés : < 25 \$
Solution orale : 75 \$ à 100 \$**

**Le fluconazole par voie orale/à action générale est
recommandé dans les cas d'affection sévère ou
réfractaire.**

**Interactions possibles avec d'autres médicaments
(inhibiteur du CYP3A4), notamment prolongement de
l'intervalle QT**

**Itraconazole
(voie orale)**

**200 mg par voie orale 1 fois par
jour pendant 7 à 14 jours**

**Capsules : < 25 \$
Solution orale : 50 \$ à 75 \$**

**Usage réservé aux cas de candidose résistante au
fluconazole**

**Risque d'interactions médicamenteuses plus élevé
qu'avec le fluconazole (inhibiteur puissant du CYP3A4)**

**Clotrimazole
(voie orale)**

**Pastilles à 10 mg pour
dissolution orale 5 fois par jour
pendant 7 à 14 jours**

50 \$ à 75 \$

Durée en fonction de la réponse

Offertes uniquement dans les
pharmacies préparatrices (non
commercialisées))

**L'utilisation
recommandée
d'agents est
conforme aux
lignes
directrices de
l'Infectious
Diseases
Society of
America
(IDSA) et à
celles en
vigueur au
Canada,
établies dans
Yeung J. et al.**

* Remarque : Le miconazole pour la voie orale n'est pas commercialisé au Canada.

Yeung J, Bunce PE, Lynde CW, Turchin I, Vender RB. Review and practical guidance on managing fungal infections in patients with psoriasis receiving anti-IL-17 therapies. *Journal of Cutaneous Medicine and Surgery*. Juil. 2022;26(1_suppl):3S-23S.